

بارداری و زایمان

سوال ۱: مطابق با سوال ۶ آزمونک نوبت ۳:

۶- خانمی با سن حاملگی ۶ هفته مراجعه کرده است و به علت ابتلا به صرع، از داروهای ضدصرع استفاده می‌کند. انتظار داریم در جنین این خانم کدام عارضه افزایش یابد و برای کاهش این عارضه چه توصیه‌ای می‌کنیم؟

۱) شکاف کام، دریافت بیشترین دوز دارو

۲) نقایص قلبی، دریافت مکمل اسید فولیک

۳) ابهام تناسلی، قطع مصرف دارو

۴) هایپرپلازی مادرزادی آدرنال، دریافت مکمل اسید فولیک

سوال ۵: مطابق با سوال ۱۰ دفترچه آزمون آزمایشی جامع ۱:

۱۰- در خانم باردار ۱۶ هفته ای، میزان AFP سرم مادر بالا گزارش شده است. بعد از بررسی با سونوگرافی تخصصی و آمیونوسنتز هیچ گونه اختلال جنینی یا جفتی شناسایی نشده است. در ادامه بارداری احتمال بروز کدام عارضه در این بیمار افزایش می‌یابد؟

۱- پلی هیدروآمیوس ۲- ماکروزومی جنین ۳- زایمان پره ترم ۴- جفت سرراهی

سوال ۶: مطابق با سوال ۵ دفترچه آزمون آزمایشی جامع ۱: (سوال عیناً تکرار شده است)

۵- خانمی ۲۵ ساله G_1P_0 به دلیل حاملگی مولار بستری شده و تحت تخلیه مول و ختم حاملگی قرار گرفته است. به منظور پیگیری بیمار تمامی اقدامات زیر صحیح می‌باشد، به جز؟

۱. پیشگیری از بارداری حداقل برای ۶ ماه

۲. بررسی سطح βhCG در ۴۸ ساعت اول بعد از تخلیه مول

۳. بررسی سطح βhCG هر ۲ هفته یکبار تا زمان غیر قابل تشخیص شدن آن

۴. بررسی سطح βhCG هر ماه برای مدت یکسال

سوال ۱۳: مطابق با سوال ۴ دفترچه آزمون آزمایشی ۸: (سوال عیناً تکرار شده است)

۴- خانمی G_2P_1 با سن بارداری ۳۴ هفته و ۵ روز با شکایت خروج ناگهانی مایع از یک ساعت قبل به شما مراجعه می‌کند. در بررسی با تست نیتراژین PH واژن وی ۷ می‌باشد. خانم نشانه هایی از وجود دردهای زایمانی را گزارش نمی‌کند. اقدام مناسب چیست؟

۲- تجویز آنتی بیوتیک و توکولیتیک

۱- بستری و تحت نظر گرفتن بیمار

۴- سزارین

۳- القای زایمان با اکسی توسین



سوال ۱۶: مطابق با سوال ۱۸ دفترچه آزمون آزمایشی ۱ و سوال ۱۹ آزمونک نوبت ۱: (سوال عیناً تکرار شده است)

۱۸- خانمی با دیسمنوره اولیه و منوراژی بدون مشکل خاص دیگری مراجعه کرده است. ارجح ترین درمان کدام است؟

- ۱- قرص های کتراتسپتینو خوراکی ترکیبی
 ۲- شیاف پروژسترون
 ۳- هیوسین
 ۴- آسپیرین

۱۹- کدام جمله در مورد دیسمنوره اولیه نادرست است؟

۱) درد ناشی از دیسمنوره اولیه در چند ساعت قبل از قاعدگی آغاز می شود.

۲) با ماساژ شکم و حرکت بدن بهبود می یابد.

۳) در معاینه دستی، سرویکس شدیداً دردناک می باشد.

۴) اعضای لگن در دیسمنوره اولیه طبیعی است.

سوال ۱۸: مطابق با سوال ۱۹ دفترچه آزمون آزمایشی ۲ و سوال ۱۷ دفترچه آزمون آزمایشی ۹: (سوال عیناً تکرار شده است)

۱۹- خانمی ۵۴ ساله که ۲ سال از منوپوزوی می گذرد با شکایت خارش و سوزش در ناحیه تناسلی، دیسپارونی، احساس

فوریت در دفع ادرار مراجعه کرده است. درمان موثر کدام است؟

- ۱- استروژن موضعی
 ۲- لوبریکانت
 ۳- جراحی
 ۴- گزینه ۱ و ۲ صحیح است

۱۷- خانمی ۵۵ ساله با شکایت خونریزی واژینال به درمانگاه مراجعه کرده است. وی اذعان دارد که ۳ سال پیش یائسه شده است.

شایعترین علت آن چیست؟

۱- کارسینوم آندومتر

۲- پولیپ های آندومتر

۴- آتروفی آندومتر

۳- هورمون درمانی

سوال ۱۹: مطابق با سوال ۲۰ دفترچه آزمون آزمایشی ۵ و سوال ۱۷ آزمونک نوبت ۴:

۲۰- خانمی ۳۵ ساله با شکایت خارش و سوزش و ترشحات واژینال مراجعه می کند. وی اظهار دارد که میزان این ترشحات

پس از نزدیکی جنسی افزایش می یابد. در معاینه ترشحات خاکستری رنگی دیده می شود که به صورت لایه نازکی در دیواره

واژن وجود دارد. در بررسی میکروسکوپی ترشحات، لکوسیت قابل مشاهده نمی باشند. تشخیص چیست و درمان خط اول این

بیماری کدام است؟

۲- واژینوز باکتریال - کلوتریمازول

۱- واژینوز باکتریال - مترونیدازول

۴- تریکوموناز واژینالیس - کلوتریمازول

۳- تریکوموناز واژینالیس - مترونیدازول

۱۷- خانمی ۲۸ ساله در معاینه واژینال دارای ترشحات چرکی اندوسرویکال زردرنگ همراه با اریتم و شکنندگی ناحیه اکتوبی

است. در لام *Mucopus*، تعداد نوتروفیل ها بیش از ۴۰ عدد در میدان میکروسکوپی و دیپلوکوک های گرم منفی داخل سلولی

دیده می شود. درمان مناسب چیست؟

۴) آزیترومایسین

۳) داکسی سیلین

۲) اریترومایسین

۱) سفتریاکسون

نوزادان و مراقبت های مربوطه

سوال ۲۱: مطابق با سوال ۸ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۸:

۸- در بررسی چشم نوزاد، در صورت وجود رفلکس سفید مردمک (لکوکوری)، خطر بروز تمامی اختلالات زیر مطرح می شود به جز؟

- ۱- گلوکوم ۲- کاتاراکت ۳- کوریورتینیت ۴- رتینوپاتی نرسی

سوال ۲۲: مطابق با سوال ۱۸ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۱ و سوال ۱ نوزادان دفترچه آزمون جامع آزمایشی ۳:

۱۸- در همه شرایط زیر خطر بروز ادم ژنرالیزه وجود دارد به جز:

- ۱- سندرم هارلر ۲- نرسی
۳- هیدروپس غیرایمنی ۴- تجویز نیترات نقره

۱- نوزاد دختری حاصل زایمان سزارین با آپگار $\frac{9}{10}$ در اتاق عمل متولد شده است. در بررسی انجام شده نوزاد طبیعی به نظر می رسد و تنها اندامها به صورت ادماتو می باشد اما سایر نقاط بدن طبیعی است. احتمال وجود کدام اختلال در این نوزاد افزایش می یابد؟

- ۱- نفروز مادرزادی ۲- سندرم ترنر ۳- سندرم هارلر ۴- سندرم

سوال ۲۴: مطابق با سوال ۱۹ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۶: (سوال عیناً تکرار شده است)

۱۹- کدامیک از علائم زیر جز تظاهرات بالینی پلی سیتمی در نوزاد می باشد؟

- ۱- ترومبوسیتوز ۲- هایپرگلیسمی ۳- تشنج ۴- دیسترس تنفسی

سوال ۲۵: مطابق با سوال ۳ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۸ و سوال ۳ نوزادان دفترچه آزمون جامع آزمایشی ۱:

۳- مصرف کدامیک از داروهای زیر توسط زنان باردار می تواند سبب ناشنوایی جنین شود؟

- ۱- استرپتومایسین ۲- کاربامازپین ۳- سیکلوفسفامید ۴- اریترومایسین

۳- تجویز کدامیک از داروهای زیر خطر بروز تنگی پیلور را در نوزاد نارس به دنبال دارد؟

- ۱- کلرامفنیکل ۲- اریترومایسین ۳- استرپتومایسین ۴- تتراسیکلین

سوال ۲۷: مطابق با سوال ۱۴ نوزادان دفترچه آزمون جامع آزمایشی ۱: (سوال عیناً تکرار شده است)

۱۴- نوزاد ۳ روزه ای را به علت تنگی نفس و استفراغ به اورژانس آوردند. در معاینه قفسه سینه در سمت چپ صداهای ریوی به گوش نمی رسد و شکم نرم و فرورفته است. کدام تشخیص بیشتر مطرح است؟

- ۱- فتق دیافراگماتیک ۲- پنوموتراکس
۳- هایپوپلازی ریه ۴- فتق پارا ازوفازیال



سوال ۳۲: مطابق با سوال ۷ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۱: (سوال عیناً تکرار شده است)

۷- کدامیک از ضایعات پوستی زیر حاوی نوتروفیل می باشد؟

- ۱- اریتم توکسیکوم
- ۲- ملانوز پوستولی
- ۳- همانژیوم های کاورنوس
- ۴- موتلینگ

سوال ۳۴: مطابق با سوال ۳ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۶: (سوال عیناً تکرار شده است)

۳- در صورت وجود تمامی شرایط زیر خطر ایجاد توپی های مکونیومی در نوزادان افزایش می یابد به جز؟

- ۱- سوء مصرف مواد مخدر توسط مادر
- ۲- درمان پره اکلامپسی با سولفات منیزیم
- ۳- تجویز کلسیم به مادر طی بارداری
- ۴- ابتلا به فیبروکیستیک

سوال ۳۸: مطابق با سوال ۱۴ نوزادان دفترچه آزمون آزمایشی ۷:

۱۴- نوزادی به دلیل استفراغ و اسهال شدید به درمانگاه مراجعه کرده است. در بررسی ها متوجه ابهام دستگاه تناسلی وی می شویم، به طوری که کلیتوریس نوزاد بزرگ شده است و نوزاد دچار هایپرتانسیون، هایپرکالمی و هایپوناترمی است. احتمال وجود کدام اختلال مطرح می شود؟

- ۱- هایپوتیروکسینمی گذرای نوزادان
- ۲- هایپوتیروئیدی اولیه
- ۳- هایپرپلازی مادرزای فوق کلیه
- ۴- هایپوپاراتیروئیدی گذرا